

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

DLP-2-9-76

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE - GARD - HERAULT - LOZERE - PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE - BAT. 5 - PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX - TEL. 92.28.72

ABONNEMENT ANNUEL :

Régisseur de recettes de la D.D.A.

C.C.P. Montpellier 5238-57

N° 30 - 1976

TOUTES ESPECES FRUITIERES

MOUCHE DES FRUITS (Cératite) -

Des attaques sur pêches, prunes, nectarines, ont été observées ou signalées en provenance de l'ensemble de la Circonscription Languedoc-Roussillon ainsi que la Station d'Alertes Agricoles l'a déjà indiqué.

- Tous les fruits, y compris les figues et les fruits sauvages peuvent être parasités par le ravageur. La présence d'asticots (à ne pas confondre avec les jeunes larves de Carpocapse, de Tordeuse Orientale, d'Anarsia, presque toujours solitaires) permet une identification.

On doit rechercher les premiers dégâts facilement décelables (début de pourriture autour de la piqûre de ponte). Les premiers fruits parasités (ainsi que les premiers piégeages) ont été observés à proximité de dépôts d'immondices.

Au fur et à mesure des récoltes les risques de dégâts s'intensifient pour les fruits encore pendants de toutes les espèces fruitières.

Il convient d'éviter des dégâts calamiteux sur ces récoltes tardives ou demi-tardives, les fruits piqués se révélant rapidement invendables.

(Sur pommiers le traitement pourra être placé entre deux cueillettes en utilisant un produit à courte rémanence utilisable 7 jours avant récolte).

ABRICOTIER

Reprendre la lutte contre l'Oïdium.

ABRICOTIER & PRUNIER

Une pulvérisation cuprique permettra de réduire les infestations ultérieures de Rouille.

POURRIER & POMMIER

Maladies de conservation et lésions du fruitier

Dans les vergers touchés par les pluies d'orage des 23, 25 et 29 août, procéder à un, et si possible, à deux traitements.

OLIVIER

Mouche de l'olive (Dacus)

La détection du vol est ininterrompue en particulier à Montpellier. Il faut renouveler la protection. L'adjonction d'un produit anti-dryptogamique cuprique est souhaitable dans les cultures où sévit la Funagine.

Respecter les délais d'emploi avant récolte.

Pour le Chef de Circonscription,

L.L. TROUILLON

L'Ingénieur,

M. TISSOT

7195

Tirage du 31 août 1976 - 1500 exemplaires.

N° d'inscription P.P. : 531 A.D.